

**POLSKI
PROBIOTYK**



Lavipan **PL5**

PROBIOTYK W POSTACI PROSZKU DO ROZPUSZCZANIA W WODZIE

- Optymalizuje mikroflorę przewodu pokarmowego
- Poprawia strawność i wykorzystanie składników pokarmowych
- Eliminuje niebezpieczne patogeny z przewodu pokarmowego
- Ma korzystny wpływ na układ immunologiczny



JHJ Sp. z o.o.

Nowa Wieś 11, 63-308 Gizatki, tel.: +48 62 741 92 94, fax: +48 62 741 93 28, www.jhj.pl



LAVIPAN® PL5 to wyjątkowa kompozycja mikrokapsułkowanych bakterii kwasu mlekowego, która ma istotny wpływ na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Bakterie kwasu mlekowego zawarte w preparacie:

- *Lactobacillus casei*
- *Lactobacillus plantarum*
- *Leuconostoc mesenteroides*
- *Pediococcus pentosaceus*

Zawartość bakterii w preparacie LAVIPAN wynosi nie mniej niż 4×10^{12} jtk/kg.




WSKAZANIA:


Preparat należy stosować w celu ograniczenia rozwoju patogennej flory bakteryjnej w szczególności *Escherichia Coli*, *Salmonella sp.*, *Clostridium sp.*, *Campylobacter sp.*, w przewodzie pokarmowym. Ponadto stosowanie kompleksu probiotycznego **LAVIPAN® PL5** poprawia strawność białka i węglowodanów, przyswajalność mikroelementów, a także wykorzystanie paszy.

Wpływ bakterii probiotycznych zawartych w preparacie LAVIPAN na bakterie patogenne

Salmonella Enteritidis



Campylobacter jejuni



ZALECENIA:

W celu optymalizacji mikroflory jelit prosiąt, warchlaków, loch i tuczników w okresach stresowych, przy zmianie paszy i po antybiotykoterapii, probiotyk zaleca się stosować w wodzie, w zalecanych ilościach przez minimum tydzień. W celu poprawy wyników produkcyjnych probiotyk należy stosować profilaktycznie w zalecanych dawkach przez 3 dni co tydzień.



STOSOWANIE:

50-200 g na 1000 litrów wody



PRZYGOTOWANIE:

Przygotowanie roztworu roboczego:

Odpowiednią ilość preparatu dokładnie wymieszać w 10 litrach wody i odstawić na 1 godzinę, po tym czasie intensywnie mieszać przez 5 minut do rozpuszczenia. Jeżeli roztwór roboczy stał dłużej niż godzinę należy go przemieszać przed podaniem przez ok. 1 minutę. Roztwór roboczy należy zużyć w ciągu 10 godzin.



OPAKOWANIE:

Opakowania: 600 g, 5 kg

